

הטיפול התרופתי לכאב בשבועיים שלאחר הניתוח

טיפול תרופתי קבוע במשך שבועיים

לפני שינה

Tab. Tramadex OD 100 mg x 1/day
Tab. Stilnox 10 mg x 1/day

לאחר ארוחת בוקר

Tab. Celecoxib 200 mg x 1/day
Tab. Nexium 20 mg x 1/day



כאב חזק VAS 7-10

Tab. Targin 10 mg x 2/day

או

Tab. Percocet 5 mg 2 tab x 3/day

Tab/syr Optalgin 1 g x 3/day



לפי הצורך Avilac

*במידה שלמטופל יש בעיה בנטילת פרצטמול (בעיה כבדית) להחליף את הפרקוסט לתרופה ללא פרצטמול כדוגמת טרגין.
לכאב הניורופטי - Pregabalin 75 mg
או
Gabapentin 300 mg
כמויות לפי מידת הכאב הניורופטי



כאב בינוני VAS 4-6

Tab. Zaldiar 1-2 caps x 3/day

Tab/syr Optalgin 1 g x 3/day

או

Tab. Rokacet plus 1-2 x 3/day

Tab/syr Optalgin 1 g x 3/day



לפי הצורך Avilac

*במידה הצורך ניתן להחליף רוקסט פלוס בזלדיאר



כאב קל - VAS 1-3

Tab/syr Optalgin 1 g x 3/day

Tab. Acamol 1 g X 3/day